


Specialister i Smertekontrol

MEPIDENTAL® 30 mg/ml

Tilbyd dine patienter med
særlige behov lokalbedøvelse
uden adrenalin



Vr.Nr.123701 MEPIDENTAL®

MEPIDENTAL® 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

LITTERATUR:

1. Malamed, S.F. Handbook of Local Anaesthesia. 7th. Ed.- St. Louis, MI: Elsevier Mosby, 2020. p.67.
2. Brockmann WG. Mepivacaine: a closer look at its properties and current utility. Gen Dent. 2014 Nov-Dec;62(6):70-5; quiz 76.
3. DK: MEPIDENTAL : Summary of Product Characteristics. SPC Revision date. 10/07/2023
FI: MEPIDENTAL 30 mg/ml injektioneste, liuos: Summary of Product Characteristics. SPC Revision date. 10/07/2023
4. Tagariello V, Caporuscio A, De Tommaso O. Mepivacaine: update on an evergreen local anaesthetic. Minerva Anestesiol, 2001 Sep;67(9 Suppl 1):5-8.



Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5
Lliçà de Vall, 08185. Barcelona (Spain)

Email: export@inibsa.com
Tel.: +34 938 609 500
Fax: +34 938 437 389

Scan me




MEPIVACAINE_DK - 06/ 2024



CMS Dental
Our Innovation Your Success

Mepivacain- hydroklorid



MEPIDENTAL® 30 mg/ml er et lokalbedøvelsesmiddel med 3 % mepivacainhydroklorid. En Mepivacain uden vasokonstriktor, der er ideel til specifikke kliniske situationer.

AKTIVT STOF

Mepivacain HCl 3%

En ml opløsning indeholder 30.00 mg Mepivacainhydrochlorid.

EFFEKT

Høj styrke svarende til Lidocain.

INDIKATIONEN

Lokal anæstesi til voksne og børn over 4 år.

VIRKNINGSVARIGHED:

Pulpaanæstesi:

25 min - Infiltration
40 min - Mandibularblok

Blødt væv:

90 min - Infiltration
165 min - Mandibularblok

ANSLAGSTID:

UDEN

Vasokonstriktor

På grund af mepivacains mildere vasodilaterende egenskaber bruges det ofte i tandplejen uden en vasokonstriktor. Almindelig 3 % mepivacain anbefales til tandbehandlinger, der hverken kræver langvarig eller dyb anæstesi.¹ Oftest er beslutningen om at bruge mepivacain baseret på dets vasokonstriktoriske effekt eller mangel på samme. Det bruges ofte til medicinsk svækkede patienter - hvor det grundet forhøjet blodtryk eller hjertefrekvens frarådes at benytte adrenalin - samt til børn (den maksimale dosis skal beregnes omhyggeligt)²

MEPIDENTAL® 30mg/ml
er særlig egnet som
lokalbedøvelse
til særlige
patientgrupper

- Geriatiske¹
- Pædiatiske¹
- Med alvorlige hjerte/karsygdomme^{1,2,3}
- Med overfølsomhed for epinephrine

Gavnlige egenskaber ved MEPIDENTAL® 30mg/ml:

Mepivacain 3 % har en anslagstid på 3-5 minutter, det har en høj virkningsgrad og en lav toksicitet.³ Selv om disse faktorer kan variere afhængigt af vævets pH-værdi, viser undersøgelser, at mepivacain vil bevare sin virkningsgrad bedre, når det injiceres i områder med sure forhold, end andre anæstetika som lidocain. Dette anses for at være en fordel i tilfælde af injektion i inficeret væv, hvor pH-værdien er reduceret.² Den hurtige metabolisme af mepivacain, som finder sted i leveren og udskilles hurtigt via nyrerne, er også en vigtig farmakologisk egenskab, der skal tages i betragtning.⁴ Desuden er allergi over for mepivacain i sig selv meget sjælden.²